Raisaine

Vass3R13s161-165

William Collection Vassal-Montpellier

nliminaliminaliminaliminal

115137 x Raisaine









Désignation : Raisaine

Cles Planche M Côté S Nº 137

Vigueur: 2

Charge :

Date de mâturité (14-4 16

11.5

2-0

3-2

Désignation: Raisaine -

Clos Planched Côté & No 137

Vigueur: 3

Charge :

Date de mâturité :

2.9.57 P.O

3-1-0 2-1

Raisanie Désignation : Clos Planche McOté S No 134 Vigueur :3 Date de mâturité : le 4 9-1958 Pa=1 Charge : s. 15

2 3

3 5

411

5 3

Année J											
1 1 1	! Nombre total	20	. 23	1 26	D A .	res	1 .	· !		! .	
1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1	4. 2.4.4.3.	0.0.0.0.	0.0.1.1.1.	0. 3. 1.	1.1.3.2.2.						
	I		30-	3-56	9-						

	! ! Nembre		-		DAT	E S			
	! total	4-3	1 8/3 !	11-3	1	1	!	!	!
1	5	0	2 1	5	1	!	!	1	1
2	5.	3	3.	5.	!	1	!	1	! ! !
3 .	4 .	.0.	3.	4.	1		!		1
4	! 6 . !	D.	1.	.3.		i			
5	! .4.	0.	.0.	.4.		!			i

Année. 1958. Raisaine-

N°	Planche	 Côté	11.1157
Wigh diese of pagage with page and and one gots about the court wind bout to be come and the court and the court will be court on the court and the court of the		 =====	

1 1 1	! Nombre ! total	103	1 15/3	19/3	D !	A	T ! !	E	S ! !		!!		!	
! ! ! !	.6.	.1.	1.2.	. V.5	!		1 .		1 .		!		!	
! 2	.5.	. 0.	0	. 1.2	! .	•	! .		! .		1 0		! .	
1 3	5.	.0.		4.3	1 × .	a	! .		1.		! .		1 .	
1 5 4	! 7.	.0.		.F.3	! × .	•	i .		! .		į .	,	! .	6
! 5	! .0.	1.0.	1 .0.	1.0.	! .		1 .		1.	D	! .		! .	
1	1	[<u> </u>	1	1		1		1		1		1_	

D & 19-3-58 Ie

Année 1959

Raisaine

No	30000	, r = 3 = 4 = 6 = 1 + 4 + 5 + 5 +	Planche		5.1.	37		C	óté				,	
				na sela cont con pre tres tres con servi	ammo	-	-	-	ab pineto co	materia.	-	-	-	-
1	Nombre			D	A	T	E	S						
	m		THE PERSON NAMED IN		-	- bearings		-	-		-	-	-	-

í	Nombre				D A	T E S			
!	! Total	11.3	14.3	1		ľ i		1	1 1
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	8.	.5.	1.6				4 P		
1 3	.6.	. 2/	13.	1		1 1	b (1	1 1
1 4	1 .8.	٠٨.	13.	1					1
1 5	1 .4 .	.1.	13.		4 0		n c		1 \$
1	1	L	1	1		1 1			1 1

D le 13-3-59

Désignation: Raisaine

VASSAL Planche 41 Côté S No137 Souche 123 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- '41 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
 - 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 5 duveteux (8) cotonneux 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

la 3° feuille détachées sera notée.

- 43 39 Elabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de

1 3 MAI 1955

Nº ordre

Raisaine Désignation :

Planche 11 côté S Nº 137 souche 123 4 5 VASSAL

(E) JEUNES FRUILLES DU BAS

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7

27 - sur nervures 7 = sur limbe 8.46

- 27 à limbe plan 🛈 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 1729 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

 1830 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- - 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
 - 33 entièrement (2 partiellement 2.
 - 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
 - 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9 .

26 MAI 1955

Truel

Nº ordre

Designation: Raisaine

VASSAL Planche 11 côté 5 Nº 137 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 7 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Laudier 15-6-55

No ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté S N9137 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

 limbe : glabre séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point péticlaire 6.
- Nervures : face supérioure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4,

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc - vert foncé 3 · vert plcmbé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court
- glabre (séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 5 partiellement 7 totalement 8.
- coloré partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle péticle/mameau : inférieur à 90° () égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

BRock

No ordre

Désignation

VASSAL planche M côtá S N9/ 37 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - limbe: glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan () en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 moyen @ court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

J. Finet 23 111 1958

```
VASSAL planche 1 côté S Nº 137 souche 1 2 3 4 5
    - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
       cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5)
   - Très grosse 1 - Grosse - Moyenne - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - trocalité
      de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - De couleur blanc 1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5,
2 - Très pruinée ? - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
               arquée 8 - autre 9,
     - A ombilic persistant 1) - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
    - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimé (7)
    - A jus incolored - coloré 2.
    - A peau fine 3 - mcyenne 4 - épaisse 5.
 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musqués 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
        herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourralet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9,
     - A hourrelet : évident ? - peu apparent 2.
 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6,
     - A pinceau : coloré 3 - non coloré 9
35 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.
```

Paisaine

Nº d'ordre

Désignation

Mouquie 179-56

Dénomination ... flaistaine I653 Sarment de Vigne. Sarment : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). 11 : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre 2, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). 11 : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rouge 4.12.56

No d'ordre: . o. 14003. . . . Désignation: . Raisaine. 8 - Angle des nervures 1 -(2)-(3) 12 - S. lat. sup. (prof.). 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.). 0 - 1 -(2)-(3). 14 - S. pét. (forme). 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 5. 17 - Dents : Méd/B. 1 -2-3 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -(2) - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du labe latéral supérieur : Direction : (1-2-3. Forme : 4-5. Médiane/Base: 6-7-8

Tinet 57

RAISAINE 0440-03 No d'ordre: . O 38401 . Désignation: Raillaine . . 8 - Angle des nervures 1 -2 -3 9 - L₁/L · · · · · · · · · ① - ② - 3 · 11 - Lobes 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 17 - Dents : Méd. /B. 1 - 2 - 3 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P.: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : : 1-2-3. Direction Forme Médiane/Base : 6 - 7 - 8

Formulaire de description 1/8

(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2001

Code cépage: 0140

Code clone :03

Nom cépage: Raisaine N Emplacement: 3 R13 s161-165 Observateur

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 303 époque de véraison: très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 304 maturité physiologique de la baie: très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
•					
2	2	6-3	6-3	0	
3	Н	23-2	26_2	0	
4	2	28-2	28 - 2/	0	
5	4		13.3	6	
Moyenne			4.3.01		

0

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)

Formulaire de description 1/8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2013

CodeIntro: 140Mtp3

CodeVar: 140 Nom Var: Raisaine Observateur:

Emplacement: Vass3R13s161-165

13

-					
Рн	EN	OI	0	CI	H

			3	5	7	9
Code	Descripteur	1	3	3		
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

	110	OFFICE CHOIS		_	The state of the s	
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459 Degré de résistance Botrytis grappe	très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée
---	--------------------------	---------	--	--------------------------

1	Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 6/5	Fertilité (grappes/10 yeux)
	1	6			2	
	2	6 souther			5 Carlaita	nauper.)
	3	6 rongers)			4	
	4	4			1	
	5	5			3	
	Moyenne	27			15	6

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
27.05	30.05		31/07	06 108 +2	13.09 0	

Dates	30.08	2-09	06.09	13.09
IR	47	18,75	19	20
Valeur papier PH				

Remarque:

Formulaire de description 2/8 (floraison)

Année: 2001

Observateur

Code cépage : 140 Nomintroduction: Raisaine N

Code introduction: 03

Emplacement : 3 R13 s.161_165

Pas de gipes

Bourgeonnement

oiv 001 forme: globuleuse 3 - demi-ouverte 5 - ouverte 7).

oiv 002 distribution pigmentation anthocyanique: absente 1 - en liseré 2)- partout 3

oiv 003 intensité pigmentation anthocyanique : nulle ou très faible 3 - moyenne 5 forte 7 - très forte 9

oiv 004 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 oiv 005 densité poils dressés : nulle ou très faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

Jeunes feuilles

oiv 051 couleur face supérieure (4° feuille détachée) : verte 1 - jaune 2 - plages bronzées 3) cuivrées rougeâtre sur toute la surface 4.

oiv 053 densité poils couchés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible D- faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 054 densité poils dressés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 15- faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 055 densité poils couchés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 056 densité poils dressés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible D- faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

Vassal :

Jeunes feuilles du haut (3 premières détachées)

Profil: étalées 7 - en gouttière 2 - autre 3.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 280 - moyenne 200 - très forte 201

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 299 - faible 202 - moyenne 203 - très forte 204 Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 Couleur face sup. : blanc 205 - fauve roux 206 - carminé 207 - liseré carminé 208 - jaune 209 -

plages bronzées ou cuivrées (210' - vertes 212 - autre 213 (Dans le cas où la 1° feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° feuille détachée sera

Jeunes feuilles du bas (3 suivantes)

Profil: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 284 - moyenne 215 - très forte 216

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 285 - faible 223 - moyenne 224 - très forte 225 Densité poils dressés nervures face inf. : nulle ou très faible 282 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés nervures face inf. : nulle ou très faible 283 - faible 217 - moyenne 218 très forte 219.

Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible () - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible (1)- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 Couleur face sup. blanc 226 - fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune 230 -

plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vertes [33]

Formulaire de description 3/8 (floraison)

Année : 2001 Code cépage :

Code introduction: 03

140 Nom introduction: Raisaine N Observateur TP

Emplacement 3 R13 A161, 165

Rameau herbacé

oiv 006 port : érigé 1 - demi-érigé 3 - horizontal 5 - demi-retombant 7 - retombant 9. oiv 351 vigueur rameaux : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 007 couleur face dorsale entrenoeuds : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge oiv 008 couleur face ventrale entrenoeuds : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3 oiv 009 couleur face dorsale noeuds : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3 oiv 010 couleur face ventrale noeuds : verte 1 - verte à raies rouges 22 rouge 3

oiv 011 densité poils dressés noeuds : absence 1 - présence 9. oiv 012 densité poils dressés entrenoeuds : absence 7 - présence 9 oiv 013 densité poils couchés noeuds : nulle ou très faible ()- moyenne 5 - forte 9

oiv 014 densité poils couchés entrenoeuds : nulle ou très faible (1- moyenne 5 - forte 9

oiv 015 pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons : nulle ou très faible 1 - faible 3moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 016 distribution vrilles: discontinue (2 ou moins) 2 subcontinue ou continue (3 ou plus) 2 oiv 017 longueur vrilles: très courtes (<10cm) 1 - courtes (15cm) 3 - moyennes (20cm) 5 - longues (25cm) 7 - très longues (>30cm) 9.

Inflorescence

oiv 151 sexe de la fleur : mâle 1 - mâle à hermaphrodite 2 - hermaphrodite 3 - femelle à étamines érigées 4 - femelle à étamines reflexes 5.

oiv 152 niveau insertion 1° inflorescence : jusqu'au 4° noeud 1 - au-delà du 4° noeud 2

oiv 153 nombre inflorescence/rameau: 1 ou moins 1 - 1,1 à deux 2 - 2,2 à trois 3 - plus de trois 4 oiv 155 inflorescence sur rameaux issus des 3 yeux de la base : absence 1 présence 9

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9

Vassal:

Surface du rameau herbacé : unie 1 - côtelée(2.)

000-10 Villosité spéciale du rameau herbacé : épines ou analogues 1 - poils massifs 2, - vicino (2).

000-21 Couleur des vrilles : jaune 1 – rouge clair 2 – rouge foncé 3 – vert

Bouton floral: petit 1 - moyen 2 - gros 3

Formulaire de description 4/8 (entre nouaison et véraison)

2001 Année:

Code introduction: 03

Nom introduction: Kaisaine N

Code cépage : 140

Observateur: TD

Emplacement: 3 RB sl61-165

Feuille adulte

oiv 065 taille: très petite 1 - petite 3 - moyenne 5 - grande 7 - très grande 9.

oiv 067 forme du limbe : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3 - orbiculaire 4 - réniforme 5.

oiv 068 nombre de lobes : feuille entière 1 - trois 22 - cinq 3 - sept 4 - plus de sept 5.

oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3 - vert moyen 5) vert foncé 7.

oiv 070 pigmentation anthocyanique des nervures, face supérieure : nulle 1 - point pétiolaire

rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3- rouge après première bifurcation 4.

oiv 071 pigmentation anthocyanique nervures, face inférieure : nulle 1 - point pétiolaire rouge

- rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 074 profil: plan 1 - en gouttière 2 - involuté/37 révoluté 4 - tourmenté 5.

oiv 073 ondulation limbe (entre nervures I ou II) : absente D- présente 9.

oiv 072 gaufrure limbe (dépressions entre nervures II ou III) : absente 10 - présente 9.

oiv 075 cloqure face supérieure limbe (relief entre nervures de dernier ordre) :

nulle ou très faible 1 - faible 3)- moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure :

nulle ou très faible Ø - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure :

nulle ou très faible N- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1) - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absente 1 - présente 9

oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente 1 - présente 9.

Pétiole

oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très faible & - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 091 densité poils dressés : nulle ou très faible & - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane :

beaucoup plus court 1 - plus court 3 - égal 5 - plus long 7 - beaucoup plus long 9.

[sinus pétiolaire : ouverture = 1-2/3-4-5-6 / forme = U-accol. O dent = oui-non / dégarni - non-parfois-oui]

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

Vassal:

Densité poils couchés limbe face supérieure :

nulle ou très faible 1) - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés limbe face supérieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 000-06 Couleur du pétiole : vert 3 - partiellement coloré 2 - coloré 1)

Formulaire de description 5/8 (maturité) Année: Loot 2002 Observateur Code cépage : 140 Code introduction: 03 Emplacement 3 R13 s. 161. 165 Nom introduction: Kaisaine N Grappe oiv 202 longueur : très courte (<10 cm) 1 - courte (10-14 cm) 3 - moyenne (14-18 cm) 5 longue (18-25 cm) (7- très longue (>25 cm) 9. Valeur absolue (en cm.): 19 oiv 203 largeur : très étroite (<5 cm) 1 - étroite (5-10 cm) 3 - moyenne (10-15 cm) 50 large (15-20 cm) 7 - très large (>20 cm) 9. Valeur absolue (en cm.): 14, 5 oiv 204 compacité : très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 9 - très compacte 9 oiv 206 longueur pédoncule : très court (<3 cm) 1 - court (3-5 cm) 3 - moyen (5-7 cm) 5 long (7-10 cm) 7 - très long (>10 cm) 9. 5,5 oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement - moitié 5 - plus de la moitié 7. oiv 208* forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale - en entonnoir 3.

oiv 209* présence d'un aileron : absent 1 - une à trois ailes D- plus de trois ailes 3 Baie oiv 220 longueur : très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue (20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9. Valeur absolue (en mm.) 18 oiv 221 largeur : très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5- large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9. Valeur absolue (en mm.): 48 oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1 - uniforme oiv 223 forme : aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 cylindrique 7 - arquée 8 oiv 225 couleur épiderme : vert jaune 7 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 bleu noir 6 oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme D oiv 227 pruine : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 oiv 228 épaisseur pellicule: très mince 1 - mince 3 - moyenne 6 - épaisse 7 - très épaisse 9 oiv 229 ombilic : peu apparent 1 - apparent 2

oiv 230* coloration de la pulpe : non colorée / - colorée 2. oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée # - coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9. oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse 1 - juteuse/2. oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7 oiv 235 fermeté pulpe très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9 oiv 236 saveur : aucune D- goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - autre 5 oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9. 5 oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 6 difficile 7 - très difficile 9 oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3 oiv 242 longueur pépins: très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9.6 oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9.

Vassal: 000-11 grappe: axe de la rafle: non coloré 2 - coloré 1 000-18 région ombilicale : déprimée 1 – non déprimée D Millerandage nul à très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - fort 7 - très fort 9

oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes 1) - présentes 2

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année: 2001

Code cépage :

Code introduction: 03

Nom introduction:

Kaisaine N

Observateur: TD

Emplacement: 3 R13 s161-165

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique P - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2)- rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles : absentes V- présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds : absence / - présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenœuds : absence 1) - présence 9.

oiv 351 vigueur : très faible 1 - faible 3 - moyenne \(\mathbb{G} \)- forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons: très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue 100

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) & moyen (11mm) 5

grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Valeur absolue . 8

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3)

Pruine sur sarment : absence 1 – partiellement présente 2 présente 3

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année: 2002 Code cépage 140 Code introduction 03 Nom introduction Raisaine N

Observateur TD

Implacement 3 R 13 A 161-165

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 elliptique aplatic 5 oiv 102 surface : mie 1 côtelée 2 - striée 3

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre Ø rouge violacé 3 gris 4

oiv 104 lenticelles absentes 9 - présentes 9

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds absence présence 9 présence 9 présence 9 présence 9

oiv 351 vigueur : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 4 - très forte 9 - oiv 352 croissance prompts-bourgeons : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 5 - très forte 9

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (60mm) 1 courts (90mm) 3 movens (120mm) 8 longs (150mm) 7 très longs (~180mm) 9. Valeur absolue 120 oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (~5mm) 1 petit (8mm) 3 moven (11mm) 5 grand (14mm) 9 très grand (~17mm) 9. Valeur absolue 13

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha : très faible 1 faible 3 - moyen 5 élevé 7 très élevé 9 oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 moyen 5 élevé 7 très élevé 9, oiv 553 aptitude à la phizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 très élevé 9.

Vassal:

Nocuds : aplatis 1 mes ens(2) - saillants 3.

Pruine sur sarment Assence (1) partiellement présente 2 présente 3